



ГРУППОВАЯ АПТЕЧКА | ВАРИАНТ

Блок 1 «Остановка кровотечения»

кровоостанавливающий жгут (1 шт.)

Для наложения на сложные анатомические области



Жгут Эсмарха

или



Жгут SWAT (США)

турникет (2 шт.)

Для дозированной компрессии при остановке кровотечения на конечностях



Турникет «Медплант»

или



CAT (США)

гемостатический бинт (3 шт.)

Для локальной остановки кровотечения и «ухода» от жгута



«Гепоглос»

или



«Гемофлекс»

Блок 3 «Перевязка ран»

перевязочный пакет средний (4 шт.)



ППИ 6" (Израиль)

или



ППИ (Э) - (10)

перевязочный пакет большой (1 шт.)



ППИ 8" (Израиль)

или



ППИ (Э) - (15)

средства для обработки ран и ожогов (4 шт.)



Средство для заживления ран «Локус»

+



Противоожоговый гель

Блок 5 «Вспомогательные средства»



медицинские перчатки (4 пары)



маркер (1 шт.)



термометр (1 шт.)



тактические ножницы (1 шт.)



лейкопластырь 5x500 см (1 шт.)



шины (2 шт.)



термоодеяло (2 шт.)



термохимический пакет (2 шт.)



гипотермический пакет (2 шт.)



химический источник света (2 шт.)



пульсоксиметр (1 шт.)




пинцет (1 шт.)

Блок 2 «Восполнение кровопотери»

устройство внутрикостного доступа (1 шт.)

При невозможности внутривенного доступа



Система внутрикостного доступа EZ-IO (США)

или



Удароуправляемый пистолет BIG (США)

или



Устройство для канюлизации костей

плазмозамещающие растворы

0,9 % раствор NaCl - 1,5 л

6 % Волювен - 0,5 л

+

дополнительно

0,9 % раствора NaCl - 250 мл у каждого военнослужащего





0,9 % раствор NaCl

+




6 % Волювен

устройство для инфузии (4 шт.)



катетер внутривенный (4 шт.)



Блок 4 «Восстановление дыхания»

окклюзионный пластырь (2 шт.)



HyFin Vent Chest Seal (США)

декомпрессионная игла (1 шт.)



ARS Needle Decompression KIT(США)

назофарингеальный воздуховод (2 шт.)



мешок Амбу BVM (США) (1 шт.)



Блок 6 «Дополнительные средства»

Азитромицин 500 мг (по одной таблетке в день при гнойной инфекции);

Регидрон (1 пакет на литр воды, пить 1-2 литра при обезвоживании);

Лоперамид (2 капсулы на один прием, до 8 шт в сутки, при диарее);

Полифепан (1-2 пакета разбавить водой и выпить при отравлении);

Левомеколь (мазь закладывать в открытую рану после ее очистки);

Кетопрофен (гель, применять при растяжениях и боли в мышцах);

Лоратадин (по 1 таблетке в день при аллергических реакциях);

Ибупрофен (по 1-2 таблетки при боли и высокой температуре);

Хлоргексидин (2 флакона, антисептик для промывки ран).

Средства перемещения



Носилки мягкие Stitch Profi (1 шт.)



Стропа эвакуационная Stitch Profi (1 шт.)



Ампульные препараты

Супрастин (противоаллергическое);

Нашатырный спирт (в оплетке);

Преднизолон (противошоковое);

Кордиамин (противошоковое);

Дротаверин (снятие спазма);

Кеторол (обезболивающее);

Салфетки спиртовые (20 шт.);

Шприц, 2 мл - 4 шт.